

การขยายพันธุ์กระถินเทпаลукผสมโดยวิธีการปักชำ

Propagation of *Acacia mangium* Willd. X *A. auriculaeformis*

A. Cunn. Ex Benth. By cutting Technique)

สมัย สีໄທ

บทคัดย่อ

กระถินเทпалукผสมเป็นไม้โตเร็วที่นิยมปลูกกันมากในปัจจุบัน เนماกับการตั่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นปลูกเพื่อใช้เป็นไม้เอนกประสงค์ เนื่องจากสามารถปลูกเพื่อปรับปรุงดิน มีร่องตัดฟันสันเพียง 5 ปี และสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้หลายรูปแบบ การขยายพันธุ์โดยเมล็ดพบว่ามีการกลายพันธุ์สูง ดังนั้นการขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถคงสายพันธุ์ที่ดี จากต้นเดิมไว้ทุกประการ ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ยุ่งยาก สามารถ เพยแพร์หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ ให้กับราษฎรในท้องถิ่นนำไปปฏิบัติได้ จากการทดลองปักชำกระถินเทпалукผสม ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2545 – 2546) โดยใช้กิ่งปักชำจากต้นแม่พันธุ์ อายุ 2 ปี จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แยกทดสอบอัตราการติดราก 3 ช่วงเวลา คือ ในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยปลายกิ่งถูกตัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ความยาวเท่ากัน (9 ซม.) จุ่มน้ำในซอร์โมน ร่างราก (IBA) ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ไม่จุ่นซอร์โมน จุ่นซอร์โมน เข้มข้น 300 ppm และ 500 ppm ในวัสดุปักชำคินผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 แล้วคลุมแปลงปักชำด้วยพลาสติกใส วางไว้ภายในตู้รักษาอุณหภูมิ 20 วัน จากผลการทดลอง พบว่า ทั้งส่วนของกิ่งปักชำและระดับความเข้มข้นของ IBA มีผลต่อการเกิดรากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.01$) โดยอัตราการติดรากลดลงเมื่อใช้กิ่งปักชำส่วนที่ 2 ($p < 0.01$) และอัตราการติดรากลดลงเมื่อใช้ซอร์โมน IBA ในระดับต่ำ ($p < 0.01$) ในทุกฤดูกาลปักชำ โดยกิ่งปักชำส่วนปลายยอด และ IBA เข้มข้น 500 ppm มีผลต่อการเกิดรากได้ดีที่สุด ส่วนการใช้กิ่งปักชำส่วนที่ 2 กล้าไม่ได้จะเกิดอาการทอโดยดีในระยะเวลาหลังการปักชำ 3 เดือน จึงไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้ปักชำ วิธีการปักชำที่ดีที่สุดคือ การปักชำด้วยส่วนปลายยอดกิ่งของเม้มีทุกสายพันธุ์ในฤดูฝนร่วมกับการจุ่นซอร์โมน IBA เข้มข้น 500 ppm ทำให้เกิดรากได้สูงเฉลี่ย 97.78 %

คำหลัก : การปักชำ, กระถินเทпалукผสม, IBA, ฤดูกาล