



ป่าเมืองเหนือ: นิเวศวิทยา ไฟป่าและการฟื้นฟู

ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564

Outline

ความสำคัญ สถานการณ์ นิเวศวิทยาป่าเมืองเหนือ

- ป่าเต็งรัง
- ป่าเบญจพรรณ
- ป่าดิบเขา
- ไร่หมุนเวียน


นิเวศวิทยาของไฟและผลกระทบในป่าเมืองเหนือ



การฟื้นฟูป่า: ตัวอย่างประสบการณ์

“

สถานการณ์ป่าไม้ของโลก ประเทศและภาคเหนือ

”





พื้นที่ป่าไม้ของโลก

พื้นที่โลก: 148,940,000 km²

Region	Forested area (km ²)	% of land area
World	39,000,000	26.19%
West Asia (Middle East and Arabia)	36,600	01.00%
Polar regions (Russia, Scandinavia and North America)	13,800,000	
Latin America and the Caribbean	9,640,000	45.67%
European Union	1,600,000	35.00%
East Asia and the Pacific	7,332,000	35.18%
Canada and the United States	4,680,000	26.00%
Australia	1,470,832	19.00%
Africa	6,500,000	21.80%

10 ประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในโลก

Country	Forested area (km ²)	% of land area
Russia	7,762,602	45.40%
Brazil	4,776,980	56.10%
Canada	3,101,340	31.06%
United States	3,030,890	30.84%
China	1,821,000	18.21%
Australia	1,470,832	19.00%
Democratic Republic of the Congo	1,219,326	52.00%
Argentina	945,336	34.00%
Indonesia	884,950	46.46%
India	778,424	23.68%

Source: Wikipedia

พื้นที่ประเทศไทย: 514,000 ตร.กม.


พื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มประเทศ ASEAN



Countries	Forest	
	Area (km ²)	% of land area
Cambodia	93,350	51.56%
Indonesia	884,950	46.46%
Laos	170,000	71.60%
Malaysia	195,200	59.50%
Myanmar	430,560	63.64%
Philippines	71,620	23.87%
Thailand	147,620	33.00%
Vietnam	123,000	37.14%
Brunei Darussalam	2,780	48.22%
Singapore	20	3.00%

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย (ตร.กม.)

ภาค	พื้นที่ภาค	พื้นที่ป่า	%
เหนือ	169,644.3	95,074.74	56.04
ตะวันออกเฉียงเหนือ	168,854.4	27,555.54	16.32
ตะวันออก	36,502.5	8,033.4	21.01
กลาง	67,398.7	20,089.04	29.81
ใต้	70,715.19	20,832.92	27.03
รวมทั้งประเทศ	513,115	171,585.7	33.44

Source: กรมป่าไม้





พื้นที่ป่าภาคเหนือ


จังหวัด	พื้นที่จังหวัด (ไร่)	พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)	%
แม่ฮ่องสอน	7,978,039.52	6,901,283.53	86.50
ลำปาง	7,805,168.84	5,472,579.57	70.11
เชียงใหม่	13,834,594.19	9,669,932.13	69.90
แพร่	4,051,912.64	2,610,863.30	64.44
น่าน	7,581,035.02	4,653,943.16	61.39

จังหวัด	พื้นที่จังหวัด (ไร่)	พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)	%
ลำพูน	2,798,924.68	1,607,517.27	57.43
อุดรดิตถ์	4,941,115.24	2,759,388.28	55.85
พะเยา	3,868,248.44	1,989,206.43	51.42
เชียงราย	7,189,310.58	2,892,488.89	40.23
รวม	60,048,349.14	38,557,202.56	64.21



การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าภาคเหนือ (2558-2560)

แผนที่การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้
ปี พ.ศ. 2558 - 2559 และ 2559 - 2560



ภาคเหนือ (9 จังหวัด)

เชียงราย	2,923,026.45	2,892,488.89	-30,537.57	-1.04
เชียงใหม่	9,680,150.64	9,669,932.13	-10,218.51	-0.11
น่าน	4,658,605.13	4,653,943.16	-4,661.97	-0.10
พะเยา	2,001,862.45	1,989,206.43	-12,656.02	-0.63
แพร่	2,603,324.70	2,610,863.30	+7,538.60	+0.29
แม่ฮ่องสอน	6,905,002.46	6,901,283.53	-3,718.94	-0.05
ลำปาง	5,517,481.66	5,472,579.57	-44,902.09	-0.81
ลำพูน	1,598,277.07	1,607,517.27	+9,240.20	+0.58
อุตรดิตถ์	2,762,839.64	2,759,388.28	-3,451.36	-0.12
รวม	38,650,570.21	38,557,202.56	-93,367.66	-0.24

ป่าไม้ในประเทศไทย

ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)

- ปกคลุมบนยอดเขาสูง อากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี เป็นป่าต้นน้ำลำธาร
- ในประเทศไทยแบ่งย่อยได้ 2 สังคมย่อย
 - ป่าดิบเขาในระดับต่ำ (Lower montane forest)
 - ป่าดิบเขาในระดับสูง (Upper montane forest)
- พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย
- พันธุ์ไม้เด่น : ไม้ยางก่อ และพืชชนิดเบญจกานต์ นางพญาเสือโคร่ง สนสามพันปี
- ไม้ขึ้นรกร : ชม้นดิน สะเดาช้าง เป้ง
- ร.ท.ก. > 1,000 เมตร

ป่าสนเขา (Pine Forest)

- มีไม้สนเป็นไม้เด่น อาจเป็นสนสองใบหรือสนสามใบ ขึ้นอยู่อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
- สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นมีช่วงความเย็นยาวนาน
- พบตามภูเขาสูงในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พันธุ์ไม้สำคัญ : สนสองใบ สนสามใบ ก่อชนิดต่าง ๆ ทุลาบขาว พันธุ์ไม้ป่าเต็งรังบางชนิด
- ร.ท.ก. 200 - 1,800 เมตร

ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)

- ป่าผลัดใบไม่มีไม้ยาง (Dipterocarpaceae) เป็นไม้เด่น
- พบในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พันธุ์ไม้สำคัญ : เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม มะขามป้อม ประดู่แดง ฯลฯ
- ไม้พื้นล่าง : ปรง มะพร้าวตัก หญ้าเล้า ฯลฯ
- ร.ท.ก. 50 - 1,300 เมตร

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)

- เป็นป่าโปร่ง ต้นไม้ทั้งหมดมีการผลัดใบในฤดูแล้ง ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย
- พันธุ์ไม้สำคัญ : สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน ฯลฯ ขึ้นปะปนกับไม้
- ไม้พื้นล่าง : ไม้ชนิดต่าง ๆ ไม้แขวง ไม้หน่อก ไม้ไร่ ฯลฯ
- ร.ท.ก. 50 - 800 เมตร

ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)

- มีพันธุ์ไม้ผลัดใบและไม้ผลัดใบในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน พบตามพื้นที่ค่อนข้างราบ
- มีช่วงแห้งแล้งยาวนาน 3 - 4 เดือน
- พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พันธุ์ไม้สำคัญ : มะค่าโมง แดง ตะเคียนหิน ยางนา ตาเสือ ฯลฯ
- ร.ท.ก. 100 - 800 เมตร

ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest)

- ป่าไม้ผลัดใบ พบบริเวณที่ราบหรือบนภูเขา
- ปริมาณน้ำฝนเกินกว่า 1,600 มม. / ปี
- พบเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออก
- พันธุ์ไม้สำคัญ : ยางนา ยางเสี้ยน ยางชุง ตะเคียนทอง หลุมพอ สังหน หวายน้ำ
- ร.ท.ก. < 600 เมตร

ป่าพรุ (Swamp Forest)


- ป่าไม้ผลัดใบ ขึ้นในที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลานาน ดินเป็นกรดจัด มีซากพืชทับถมหนา (ดินพีท)
- พบในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก
- พันธุ์ไม้สำคัญ : ตะเคียน ยางก หลุมพอ หมากแดง
- พันธุ์ไม้พื้นล่าง : หม้อข้าวหม้อแกงลิง หลุมพอพื้นควาย

ป่าชายเลน (Mangrove Forest)

- สังคมพืชที่ทนเค็มตามแนวชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำ น้ำกร่อย น้ำทะเลท่วมถึง
- พบบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยและบริเวณชายฝั่งอันดามันด้านตะวันตกของภาคใต้
- พันธุ์ไม้สำคัญ : โกงกาง แสม ลำพู ลำแพน ตะบูน พังกาหัวสุม



ชนิดป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2561



● ป่าดิบชื้น	11,916,400.68 ไร่	ร้อยละ 3.68	● ป่าเบญจพรรณ	47,194,211.82 ไร่	ร้อยละ 14.59
● ป่าดิบแล้ง	13,904,871.12 ไร่	ร้อยละ 4.30	● ป่าเต็งรัง	11,885,932.37 ไร่	ร้อยละ 3.67
● ป่าดิบเขา	10,944,716.68 ไร่	ร้อยละ 3.38	● ป่าไผ่	407,905.88 ไร่	ร้อยละ 0.13
● ป่าสนเขา	541,822.97 ไร่	ร้อยละ 0.17	● สวนป่าสัก	915,326.73 ไร่	ร้อยละ 0.28
● ป่าพรุ	273,263.28 ไร่	ร้อยละ 0.08	● สวนป่าอื่นๆ	27,552.42 ไร่	ร้อยละ 0.01
● ป่าชายเลน	1,538,185.33 ไร่	ร้อยละ 0.48	● ป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติ	1,805,895.34 ไร่	ร้อยละ 0.56
● ป่าบึงน้ำจืด	263,905.58 ไร่	ร้อยละ 0.08	● ป่าทุ่ง	386,971.31 ไร่	ร้อยละ 0.12
● ป่าชายหาด	65,840.83 ไร่	ร้อยละ 0.02	● สวนวนวัฒนูป่า	415,499.84 ไร่	ร้อยละ 0.13



□ ระบบนิเวศพื้่งฟ้าไฟ 
□ ป่าเต็งรัง
□ ป่าเบญจพรรณ
□ ป่าสน

□ ระบบนิเวศอ่อนไหวต่อไฟ
□ ป่าดิบชื้น
□ ป่าดิบแล้ง
□ ป่าดิบเขา
□ ป่าชายเลน
□ ป่าชายหาด
□ ป่าพรุ



สำนักงานกสิกรรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 81 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02 561 4292 ต่อ 5786 โทรสาร : 02 579 7583
 อีเมล : rfisurvey@gmail.com
 เว็บไซต์ : <http://newforest.go.th/land/>

อีเมล : rfisurvey@gmail.com
 เว็บไซต์ : www.facebook.com/FSPAFD





นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคเหนือ



ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed deciduous forest)

- พบอยู่ในช่วงความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 800-1,000 เมตร
- เป็นป่าโปร่ง ต้นไม้ทั้งหมดมีการผลัดใบในฤดูแล้ง ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย
- พันธุ์ไม้สำคัญ : **สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง และชิงชัน** ขึ้นปะปนกับไม้
- ไม้พื้นล่าง : ไม้ชนิดต่างๆ ไม้ซาง ไม้หูก ไม้บง ไม้ไร่ ฯลฯ







ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)

- มักพบอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นต่ำโดยกระจายตัวอยู่ตั้งแต่ในบริเวณที่ราบจนถึงพื้นที่ราบจนถึง 800-900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
- เป็นป่าผลัดใบมีไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) และป่าชนิดนี้เกิดจากการฟื้นตัวของป่าที่ถูกไฟเผาทำลายบ่อย
- พันธุ์ไม้สำคัญ : **เต็ง รัง** เหียง พลวง กราด พะยอม ตั้ว แต้ว ฯ เต็งรังผสมสน
- ไม้พื้นล่าง : ประม พรวัวเต่า หญาเพ็ก ฯลฯ











ป่าสน (pine forest)


- พบอยู่ในช่วงความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่างตั้งแต่ 700 msl ขึ้นไป
- พบไม้สนสองใบ สนสามใบ ขึ้นปะปนกับไม้ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบเขา
- ป่าเต็งรังผสมสน ป่าสนผสมก่อ
- ป่าสนบ้านวัดจันทร์ ป่าสนภูกระดึง ป่าสนภูเก้าขาว ป่าสนทุ่งแสลงหลวง






พื้นที่ป่าสนในประเทศไทย

ปี พ.ศ.	พื้นที่ป่าสน (ตร.กม.)			ร้อยละของพื้นที่ป่า
	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	
2525	2018	144	2162	
2541	1620	19.75	1639.75	1.38



สถานภาพป่าสนในประเทศไทย



ป่าสนโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

- ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อดำเนินงานโครงการปลูกป่าแผนใหม่
 - โดยขยายแปลงปลูกป่าในรูปแปลงปลูกป่าสาธิตโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปิละ 100 ไร่
 - จัดสรรให้ราษฎรเข้าเป็นสมาชิกปลูกป่า ปิละ 25 ครอบครัว ๆ ละ 40 ไร่
- มีราษฎรชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่และมีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การพึ่งพิงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับไม้สน
- แต่การดำเนินการปลูกป่าในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ไม้สน
- ไม้จากธรรมชาติจำนวนมากเริ่มมีอายุมาก บางส่วนถูกฟ้าผ่ายืนต้นตาย
- ในขณะที่ต้นสนหลายต้นมีการเจาะเก็บไม้เกียะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้ต้นสนหลายต้นเสื่อมโทรมลง
- และในระยะยาวพื้นที่ป่าแห่งนี้อาจเสื่อมโทรมลงหากไม่มีแนวทางการปลูกและการจัดการที่เหมาะสม





ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)



- เป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป
- ปกคลุมบนยอดเขาสูง อากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี เป็นป่าต้นน้ำลำธาร
- ในประเทศไทยแบ่งย่อยได้ 2 สังคมย่อย
 - ป่าดงดิบเขาระดับต่ำ (Lower montane forest)
 - ป่าดงดิบเขาระดับสูง (Upper montane forest)
- พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย
- พันธุ์ไม้สำคัญ : **ไม้วงศ์ก่อ** และพืชเมลิคเปเลื่อย นางพญาเสือโคร่ง











ไร่หมุนเวียน



















ทำซ้ำที่เดิมทุกปี











นิเวศวิทยาของไฟในป่าผลัดใบ



จังหวัด	ป่านุรักษ์	ป่าสงวนแห่งชาติ	เขต สปก.	พื้นที่	ชุมชน	พื้นที่ริมทางหลวง	รวมทั้งหมด
				เกษตร	และอื่นๆ	(๒๕๐ เมตร)	
เชียงราย	๑๕๓,๒๑๒	๒๕๐,๓๒๐	๒๒,๖๓๙	๗๔,๓๖๑	๑๖,๘๗๑	๒๔,๓๒๔	๕๔๑,๗๒๘
เชียงใหม่	๖๖๙,๙๘๑	๕๔๒,๘๐๓	๔๓,๓๐๗	๒๗,๗๑๓	๗๙,๕๓๐	๕๐,๕๗๕	๑,๔๑๓,๙๐๙
ตาก	๗๒๓,๗๓๒	๕๐๗,๒๐๑	๒๘,๗๕๒	๔๒,๙๙๖	๓๒,๐๑๕	๓๘,๗๖๖	๑,๓๗๓,๔๖๒
น่าน	๖๐๙,๙๘๓	๔๘๕,๙๕๑	๑๙,๓๕๑	๒๒,๓๒๖	๒๑,๕๑๕	๔๖,๐๒๘	๑,๒๐๕,๑๕๔
พะเยา	๒๗๗,๐๔๓	๘๗,๓๐๗	๑๕,๗๙๖	๗๑,๓๑๐	๓๕,๐๓๓	๒๒,๗๕๓	๕๐๙,๒๔๑
แพร่	๒๗๗,๑๑๙	๕๙๕,๕๘๓	๒๓,๙๙๒	๒๘,๒๕๗	๕๐,๘๕๖	๔๘,๕๘๔	๑,๐๒๔,๓๙๑
แม่ฮ่องสอน	๕๔๘,๒๒๘	๓๘๗,๗๑๓	๑,๒๗๓	๑๑,๔๕๔	๒๔,๙๘๗	๓๕,๙๖๓	๑,๐๐๙,๖๑๙
ลำปาง	๖๕๓,๐๘๔	๙๖๐,๘๔๗	๑๑๒,๒๑๙	๓๘,๓๓๔	๑๑๐,๓๖๓	๗๔,๕๕๗	๑,๙๔๙,๔๐๕
ลำพูน	๒๓๐,๔๙๕	๒๐๗,๙๑๘	๕,๕๔๐	๑๘,๔๔๒	๒๒,๕๑๗	๒๑,๖๔๙	๕๐๖,๕๖๒
อุตรดิตถ์	๕๓๗,๗๗๐	๒๐๑,๕๓๑	๓๓,๔๕๑	๘๙,๗๒๔	๙๘,๖๒๑	๔๑,๔๒๔	๑,๐๐๒,๕๒๑
รวมทั้งหมด	๔,๖๘๐,๖๔๘	๔,๒๒๗,๑๗๓	๓๐๖,๓๑๙	๔๒๔,๙๑๘	๔๙๒,๓๐๙	๔๐๔,๖๒๕	๑๐,๕๓๕,๙๙๑



Source: GISTDA



จังหวัด	ป่าอนุรักษ์	เขต สปก.	ป่าสงวน แห่งชาติ	พื้นที่ริม ทางหลวง	พื้นที่ เกษตร	ชุมชนและ อื่นๆ	
จ.เชียงราย	12525.33	14,360	73,255	183	30,422	3,497	134,243
จ.เชียงใหม่	405888.32	37,323	317,662	214	7,111	14,365	782,563
จ.ตาก	602451.91	28,157	494,544	906	19,054	32,756	1,177,869
จ.น่าน	216730.67	7,915	220,585	285	9,476	7,726	462,717
จ.พะเยา	171896.45	7,287	57,946	162	12,017	8,484	257,793
จ.แพร่	76615.38	14,470	209,258	148	5,305	7,736	313,533
จ.แม่ฮ่องสอน	832058.64	1,378	438,361	320	13,569	14,013	1,299,699
จ.ลำปาง	198557.55	75,431	478,720	1,129	19,243	27,313	800,393
จ.ลำพูน	126949.62	3,318	107,429	253	4,776	6,478	249,203
รวม	2643673.87	189,640	2,397,760	3,600	120,972	122,368	5,478,015

กำหนดวันห้ามเผา ปี 2561

จังหวัด	วันห้ามเผา	
ตาก	60 วัน	10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน
ลำปาง	60 วัน	10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน
น่าน	60 วัน	15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน
แพร่	60 วัน	15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน
พะเยา	60 วัน	16 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน
เชียงราย	60 วัน	17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน
ลำพูน	60 วัน	20 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน
เชียงใหม่	51 วัน	1 มีนาคม - 20 เมษายน
แม่ฮ่องสอน	61 วัน	1 มีนาคม - 30 เมษายน

แจ้งเหตุการณ์เผา


- ▶ ขบวนการเผาในจีนที่ก่อไว้ 191
- ▶ ขบวนการเผาในจีนที่ป่าอนุรักษ์/อุทยานแห่งชาติ 1362
- ▶ ขบวนการเผาในจีนที่ป่าสงวน 1310 กด 3



ห้วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ในพื้นที่ 9 จว. ภาคเหนือ	
เชียงราย	17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560
เชียงใหม่	20 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2560
ลำพูน	15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2560
ลำปาง	1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560
แพร่	15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2560
น่าน	15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2560
พะเยา	16 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2560
แม่ฮ่องสอน	1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
ตาก	14 กุมภาพันธ์ - 13 เมษายน 2560

ระบบนิเวศที่มีความเกี่ยวข้องกับไฟ

Healthy Fire Regimes are a Component of Environmental Health



Fire-dependent ecosystem:	53%
Fire-sensitive ecosystem:	22%
Fire-independent ecosystem:	15%

Source: Shlisky *et al.* (2007)


บริบทของไฟป่าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ฤดูไฟป่ายาวนานขึ้น
- จำนวนวันที่สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเกิดไฟมีมากขึ้น
- ไฟมีความรุนแรงขึ้น
- เกิดไฟป่าบ่อยขึ้น
- พื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่ามีมากขึ้น
- ความยากในการดับไฟป่าสูงขึ้น
- **ไฟป่ามีความถี่สูงขึ้น**
- การเกิดไฟป่าจากสาเหตุของกิจกรรมมนุษย์สูงขึ้น
- สภาพสังคมพืชและเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้น
- เพิ่มความยากลำบากในการจัดการและควบคุมไฟป่า

ลักษณะของไฟป่าสำคัญ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
“Climate change”

Sources: Flannigan and Van Wagner (1991), Price and Rind (1994), Stocks et al. (1998), Wotton and Flannigan (1993), Flannigan et al. (2005), Mouillot et al. (2002), Wotton et al. (2003), Wotton et al. (2005), Flannigan et al. (2009), Fried et al. (2004), Hennessey et al. (2005), Goldammer and Price (1998)

สามเหลี่ยมไฟ: Fire triangle



การเผาไหม้เป็นขบวนการย้อนกลับของขบวนการสังเคราะห์แสง

Heat:


conduction, convection, radiation, mass transport, vaporization, condensation

สิ่งแวดล้อมไฟ (Fire environment)

สภาพการณ์รอบๆ บริเวณที่เกิดไฟซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของไฟ

- ไม่ผันแปรตามเวลา
- ผันแปรตามพื้นที่

- ความสูงของพื้นที่
- Latitude
- ทิศด้านลาด
- ความลาดชัน
- รูปร่างของภูมิประเทศ



- ผันแปรตามเวลา
- ผันแปรตามพื้นที่

- ความชื้นในบรรยากาศ
- อุณหภูมิ
- ลม

- ผันแปรตามเวลา
 - ผันแปรตามพื้นที่
 - สามารถจัดการได้
- ลักษณะของอนุภาคเชื้อเพลิง
 - ลักษณะแหล่งเชื้อเพลิง
 - ความชื้นเชื้อเพลิง



Adaptation traits of plant

การปรับตัวของพืชในสิ่งแวดล้อมที่มีไฟ

ขึ้นกับ ชนิด อายุ ช่วงเวลา

- Flowering, forming seed, growing season, low reserved carbohydrate

ความหนาของเปลือก

Adaptation traits

- Critical temperature for plant tissue
- Bark thickness of 1-1.3 cm (Wright and Bailey, 1982)
- Position on tree trunk
- Tends to be relatively thin in young tree, becomes thicker as plant mature, and finally declines with senescence.



ตัวอย่างต้นไม้เปลือกหนา

- แดง
- ยางกราด
- ประดู่
- สหสองใบ

Adaptation traits

การป้องกันตา

- Location of meristems

การกระตุ้นการงอกของเมล็ด


- Hard seedcoat, soil seed bank: soil temp. duration of heating, seed position
- Fire destroy dormancy of seed: heat and smoke

การแตกหน่อ

- rhizome, lignotuber, root sucker: buried in the soil
- Soil is the efficient insulating material
- Generally related to plant age, stem size, season, fire frequency and fire severity

ความสามารถในการแตกหน่อของพันธุ์ไม้ป่า เต็งรัง ในพื้นที่ที่มีความถี่การเผาแตกต่างกัน

ความสามารถในการ
แตกหน่อของพันธุ์ไม้
ป่าเต็งรัง ในพื้นที่มี
ความถี่การเผา
แตกต่างกัน





Rhizome


Adaptation traits

- การโปรยเมล็ดหลังไฟไหม้
 - Keep seed on tree
 - serotinous cone
 - Seed fall on a seedbed
- กระตุ้นเมล็ดที่ฝังอยู่ในดินให้เกิดการงอก
- กระตุ้นการออกดอก
 - Monocotyledon:














Fire
















ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest)

- Plant characteristics
 - Bark
 - Coppicing
 - Seed characteristics
 - Seed dispersal
 - Leave shading and fuel characteristics
- Site fertility:
 - Nutrient dynamics
 - Soil properties

ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest)

- Fire causes:
 - Natural ?
 - Anthropogenic
- Current fire regime:
 - Low intensity, high frequency, patch damaged area
 - Annual or too frequent burning
- Appropriate burning frequency:
 - 1-2 times per decade (Wanthongchai, 2008)





Burning DDF for
Melientha suavis shoot





ป่าผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest)

- Plant characteristics
 - Bark
 - Coppicing
 - Seed characteristics
 - Seed dispersal
 - Leave shading and fuel characteristics: bamboo
- Site fertility:
 - Nutrient dynamics
 - Soil properties

ป่าผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest)

- Fire causes:
 - Natural ?
 - Anthropogenic
- Current fire regime:
 - medium intensity, relatively high frequency
 - Annual or too frequent burning
- Appropriate burning frequency:
 -?





ป่าสน (pine-related forest)

- Plant characteristics
 - Bark
 - Coppicing
 - Seed characteristics
 - Seed dispersal
 - Undergrowth characteristics: grass
 - seedling adaptation: “grass stage” *P. latterii*
- Site fertility:
 - Nutrient dynamics
 - Soil properties

ป่าสน (pine-related forest)

- Fire causes:
 - Natural ?
 - Anthropogenic
- Current fire regime:
 - medium intensity, high frequency
 - Annual or too frequent burning
- Appropriate burning frequency:
 -?





Resin tapping



Pinus latteri
Pinus kesiya



Mushroom: *Astraeus hygrometricus*







เผาบ่อยเกินไป
สวนสนภู่มขาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี

เรื่อง การประเมินพฤติกรรมไฟอ่อนหลังและการรอดตายของไม้ยืนต้นในป่าดิบ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปี 2563

โดย นิสิตคณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา









เก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม


ภายหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ 4 เดือน

วางแผนเก็บข้อมูลขนาด 20X20 ม. ทั้งหมด 12 แปลง

บันทึกจำนวนไม้ยืนต้นที่พบทั้งหมดและจำนวนไม้ยืนต้นที่ตาย




อัตราการตายของไม้ยืนต้นในป่าดิบเขา ภายหลังเหตุการณ์ไฟไหม้




ผลการเผาไร่หมุนเวียนต่อลักษณะ อุทกวิทยาและการชะล้างพังทลาย

การหมุนเวียนของน้ำ (Hydrologic cycle)



ฝนที่ตกลงมา

- A: Interception
- B: throughfall
- C: stemflow..



การใช้ที่ดินต่อสมมูลน้ำบริเวณคอยปุยและทุ่งจ้อ

	ร้อยละของน้ำจากฝนที่ตกลงมา			
	ป่าดิบเขา	ป่าปลูก	ไร่เลื่อนลอย	เกษตรกรรม
น้ำท่า	65%	22%	6.8%	60%
การระเหยของน้ำ	35%	77%	93%	39%
การไหลของน้ำในลำธาร	12 เดือน	12 เดือน	4 เดือน	12 เดือน

ที่มา: สามีคคีและคณะ (2526)


การปกคลุมเรือนยอดของป่าธรรมชาติ ไร่หมุนเวียนปีที่ 1, 3 และ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 67.73-91.67 โดยการปกคลุมเรือนยอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อไร่หมุนเวียนมีอายุมากขึ้น (กัญญาลักษณ์, 2561)

การสูญเสียดินในป่าและไร่เลื่อนลอย


	Soil bulk density (g.cm ⁻³)	Soil loss (ton.ha ⁻¹)
ป่าดิบเขาธรรมชาติ	0.56	19.6
สวนป่าสนสามใบ	0.64	14.7
ไร่เลื่อนลอย	0.90	81.9



Soil bulk density (g.cm⁻³)



Soil loss (ton.ha⁻¹)



ปริมาณตะกอนที่เกิดจากการเผาไร่ข้าวโพดพื้นที่สูง จ. น่าน

วิธีการปลูก	ปริมาณตะกอนดินที่ถูกชะล้าง (ตันต่อไร่)
ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวและเผาเตรียมพื้นที่ปลูก	12.5
ปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก	5.3
ปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการเผาและปลูกถั่วในระบบ	5.4

ที่มา: ดารากร และคณะ (2557)

การฟื้นฟูป่า

ตัวอย่างประสบความสำเร็จ



พระราชปรัชญา

“ปลูกต้นไม้ในใจคน”

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงໃใจ
คนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น ก็จะพากัน
ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วย
ตนเอง...”





การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

“...ทิ้งป่าไม้ทิ้งไว้ 4 ปี ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ป่า
เจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว...
คือว่าการปลูกนั้น สำหรับอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเอง...”

พระราชดำรัสวันที่ 4 ธันวาคม 2537

ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี

“...ถ้าเลือกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทำอะไรเลยป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูก เลยสักต้นเดียว...”

“...ไม่ไปรังแกป่าหรือตัดแย่งต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...”

“...ในสภาพป่าเต็งรังป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทำอะไรเพราะต่อไม้ ก็จะแตกกิ่งออกมาอีกถึงแม้ต้นไม้สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...”

ทฤษฎีป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

“...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง
แต่มีประโยชน์ 3 อย่าง คือไม้

ใช้สอย.....

ไม้กินได้

ไม้เศรษฐกิจ ...

ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...”

ทฤษฎีปลูกป่าในที่สูง

ปลูกป่าในพื้นที่สูง



“...ใช้ไม้จำพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ด ก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่ำต่อไปเป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...”

“...การปลูกป่าทดแทนจะต้องรีบปลูกต้นไม้ คลุมแนวร่องน้ำเสียก่อน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป...”

ปลูกป่าต้นน้ำลำธาร หรือ ปลูกป่าธรรมชาติ

- ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม คือ “...ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้างแล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้...”
- งดปลูกไม้ผืนดินจากถิ่นเดิม คือ “...ไม่ควรนำไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูก โดยยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน...”



ปลูกป่าทดแทน

“...การปลูกป่าทดแทนจะต้องทำอย่างมีแผนโดย
การดำเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา ใน
การนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทานและฝ่ายเกษตร
จะต้องร่วมมือกันสำรวจต้นน้ำในบริเวณพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อวาง แผนปรับปรุงต้นน้ำ และ
พัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง...”



ปลูกป่าตามไหล่เขา



“...การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา จะต้อง
ปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์
อเนก ประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้สำหรับ
ก่อสร้าง และไม้สำหรับ ทำฟืนซึ่งราษฎร
จำเป็นต้องใช้ เมื่อตัดไปใช้แล้วก็ปลูก
ทดแทนเพื่อหมุนเวียนพื้นที่...”

การฟื้นฟูป่า “การสร้างพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายให้มีสภาพใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าที่เคยมีอยู่เดิมให้มากที่สุด”

การปลูกป่า “การปลูกต้นไม้บนพื้นที่ที่เคยถูกทำลาย มีทั้งการปลูกป่าชุมชน การทำวนเกษตร และการปลูกไม้เศรษฐกิจต่างๆ”



สภาพพื้นที่เขาพระยาเดินธงก่อนฟื้นฟูป่า

พื้นที่เขาพระยาเดินธงหลังฟื้นฟูป่า



การฟื้นฟูให้เกิดใหม่ (reclamation) “มุ่งฟื้นฟูผลผลิตให้กลับมาใหม่อีกครั้ง หลังถูกทำลายไปแล้ว ไม่เน้นความหลากหลาย มักใช้ไม้ต่างถิ่น หรือไม้ที่ทนต่อสภาพเสื่อมโทรมได้ดี”

การฟื้นฟูผลผลิต (rehabilitation) “มุ่งฟื้นฟูผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้มีไม้ และสัตว์ในพื้นที่เดิมกลับมาอยู่ในพื้นที่บางส่วน มุ่งหวังผล ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ปลูกไม้ต่างถิ่นปะปนพอสมควร”

การฟื้นฟูระบบนิเวศ (restoration) “มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศดั้งเดิมกลับคืนมา ทั้งในแง่ของโครงสร้างของป่า ผลผลิต และความหลากหลาย ทางชีวภาพ”

ปลูกแบบเลียนแบบธรรมชาติ “มุ่งเน้นปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพ ใช้พันธุ์ไม้หลากหลายทั้งไม้เบิกนำ ไม้เด่นนำ ไม้เด่นรอง ไม้ทนร่ม และไม้พื้นล่าง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของพื้นที่หรือชนิดป่านั้นๆ”

- พื้นที่อนุรักษ์
- พื้นที่ป่าชายเลน
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

รูปแบบปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์



รูปแบบปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ปลูกแบบวนเกษตร “เป็นการปลูกพืชผสมผสานระหว่างไม้ป่าและพืชเกษตร / ปศุสัตว์ ในพื้นที่และเวลาเดียวกันตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแตกต่างกัน”


- ปลูกไม้ป่าผสมในลักษณะบ้านสวน
- ปลูกไม้ป่าเป็นแนวเขตหรือล้อมไร่นา
- ปลูกผสมไม้ 3 ชั้นเรือนยอด เพื่อการใช้ประโยชน์แบบอเนกประสงค์และยั่งยืน

- ปลูกไม้ป่าสลับเป็นแถวกับการปลูกพืชไร่
- ปลูกไม้ป่าผสมไม้ผล



ปลูกแบบเสริมป่า “เป็นการปลูกเสริมป่าธรรมชาติที่ถูกทำลายองค์ประกอบทาง
นิเวศป่าไม้บางส่วน”

ปลูกแบบขั้นบันได “เป็นรูปแบบการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ปานกลาง กำหนดแนวปลูกไปตามเส้นระดับชั้นความสูงโดยใช้
เครื่องมือ A เฟรม ลงทุนค่อนข้างสูง เหมาะในการนำไปใช้ใน
รูปแบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ป่าผสมไม้ผล”



ปลูกแบบเสริมป่า

ปลูกแบบขั้นบันได



ผลการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ณ แปลงปลูกป่า PTT-N-58-02/61
บ้านน้ำปาลมุง ต. แม่หาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.



ตำบลแม่หาด อำเภอป่าสัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ส่งเสริมการทำวนเกษตร
แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมชาวไทย
ภูเขา

Before: 2561



After: 2662



1. งานปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

- ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ แบบบูรณาการสู่ความยั่งยืน กลุ่มน้ำปายตอนบน ไทล้งแม่หาดสาละวิน
- ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกป่าแบบวนเกษตรผสมผสาน ลดการทำเกษตรเชิงเดี่ยว
- ส่งเสริมให้เกิดการค้าเห็ดเศรษฐกิจ SE ด้วยการปลูกกาแฟ โกโก้ ในพื้นที่สวนตัว ที่อยู่รอบแปลงปลูกป่า



2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

2.1 โครงการคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

➢ ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

➢ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

- ฝึกอบรมสร้างป่าสร้างรายได้
- เพาะกล้าไม้โดยชุมชน
- การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ เช่น ปลูกกาแฟ ไม้ผล (อะโวคาโด)
- นวัตกรรมปลูกและฟื้นฟูป่า

➢ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- กลุ่มแม่บ้าน งานฝีมือ

➢ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมด้านการตลาด

- แปรรูปผลิตภัณฑ์
- สร้างเครือข่ายการตลาด
- นำผลผลิตกาแฟเข้าร่วมธุรกิจ Amazon ผ่าน PTTSE




2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

3. งานศึกษาวิจัยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

1. การบริการทางนิเวศจากพื้นที่ฟื้นฟูป่าโดยโครงการปลูกป่า ปตท. (Watershed ecosystem services of reforestation areas by PTT forest plantation project) บ้านน้ำปาย ต. แม่หาด อ.ป่าสัก จ.แม่ฮ่องสอน โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้บนที่สูงโดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น ณ แปลงปลูกป่า PTT-N-58-02/61 บ้านน้ำปาย ต. แม่หาด อ.ป่าสัก จ.แม่ฮ่องสอน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ต้นน้ำชั้น 1A กลุ่มน้ำป่าตอนบน



แปลงปลูกปี 62
เนื้อที่ 800 ไร่



แปลงปลูกปี 63
เนื้อที่ 200 ไร่



Before: 2561
เนื้อที่ 1,300 ไร่



After: 2562



ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ส่งเสริมให้เกิดการค้าเห็ดตุ๋น SE ด้วยการปลูกกาแฟในพื้นที่ส่วนตัว



ขอบคุณครับ

Any questions?

Tel: 085-8370779

