



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๐-๑๐๙๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เตือนภัย โรคพิษสุนัขบ้าช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งบทความเตือนภัย โรคพิษสุนัขบ้า
ช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระบุรี เอกสาร ๑ แผ่น เรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เตือนภัย โรคพิษสุนัขบ้าช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระบุรี

จากสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย ข้อมูล ณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ๕ ราย ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา และ ประจวบคีรีขันธ์ โดยส่วนใหญ่ถูกสุนัขเลี้ยง กัด ข่วน ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และพบหัวสุนัข ที่ส่งตรวจมีผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า ใน ๓๗ จังหวัด

จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๕๓ มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๐ ราย พบผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายปี ๒๕๕๓ ที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง ๑ ราย และพบหัวสุนัขผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ตำบลธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท โดยเป็นสุนัขมีเจ้าของขนย้ายมากับ คนงานก่อสร้าง มีสุนัขสัมผัสโรค ๒ ตัว ฉีดวัคซีน และอยู่ระหว่างกักกัน ๖ เดือน คนที่สัมผัสโรค ๖ ราย ได้รับ วัคซีนครบตามนัด

การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เกิดโรคตำบลธารเกษม ดำเนินการตามมาตรการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยบังคับใช้กฎหมายทุกจุดเกิดโรคเต็มรูปแบบ โดยประกาศให้ชุมชนศรีสุขพัฒนา ม.๘ ตำบลธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการ

- สำรวจสุนัข-แมวบ้านและจรจัด
- สำรวจคนที่ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ ข่วน/ เลีย ทุกราย โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์
- สุนัข - แมว รัศมี ๕ กิโลเมตรฉีดวัคซีนทุกตัว หลังฉีดวัคซีนต้องห้อยเหรียญเครื่องหมายการฉีด วัคซีนแล้วประจำตัวสัตว์ทุกตัว

ข้อแนะนำในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๑. โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส เกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะเวลาเกิดโรคหลังรับเชื้อ ต่ำกว่า ๑ สัปดาห์ ถึง ๑ ปี อาการที่พบ คือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม กลืนลำบาก กล้ามเนื้อกระตุก หายใจไม่ออก อัมพาต หมดสติ เสียชีวิตทุกราย
๒. การป้องกันเมื่อถูกสุนัขกัด/ ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายครั้ง ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อรักษาแผลสด กักสุนัขดูอาการ ๑๐ วัน สอบถามประวัติการฉีดวัคซีน และพบแพทย์ เพื่อการป้องกันโรคที่ถูกต้องและฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน
๓. คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงสุนัข ฉีดวัคซีนทุกปี ไม่ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะและต้องคุมกำเนิดสุนัข
๔. คากา ๕ย. กั้นสุนัขกัด ย๑.อย่าแหย่ สุนัขให้โมโห ย๒.อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำสุนัขให้ ตกใจ ย๓.อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า ย๔.อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ขณะสุนัขกำลังกิน ย๕.อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ
๕. หากมีข้อสงสัย เมื่อสุนัขกัด/ ข่วน ให้ปรึกษาโรงพยาบาลทุกแห่ง ๒๔ ชั่วโมง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

นายสุชาติ ปุณณวนาจิตร
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ